

Penicillin allergi undersøgelse

Børnelægeklinikken



Formål


At undersøge om barnet er allergisk overfor Penicillin.



Forberedelse

Hvis man har mistanke om allergi overfor penicillin udføres først en blodprøve (RAST test), evt. hos egen læge, hvor der testes for forskellige former for penicillin. Hvis denne er positiv er udredningen færdig og barnet har penicillinallergi. Hvis testen er negativ fortsætter udredningen.

Barnet må ikke have fået penicillin eller antihistamin de sidste tre dage.



Undersøgelsen

Provokationen foregår i Børnelægeklinikken under tæt observation ved sygeplejerske.

- Først udføres en priktest to gange. Hvis barnet reagerer på dette betragtes han/hun som allergisk overfor penicillin. Hvis testen er negativ fortsætter undersøgelsen:
- Som hovedregel skal barnet have primcillin mikstur eller tableter (200-300mg) én gang.
- Barnet observeres herefter en time.
- Ved positiv reaktion har barnet penicillinallergi, og der kan gives antihistamin mikstur eller tablet.
- Ved negativ reaktion indenfor den første time sendes barnet hjem, og forældrene observerer barnet for eventuelle symptomer resten af døgnet. Næste dag kontaktes Børnelægeklinikken telefonisk mellem kl. 8-9. Hvis der ikke er opstået symptomer, er barnet ikke allergisk, og kan tåle penicillin.

Symptomer på penicillinallergi:

- Kløende hududslæt
- Nældefeber
- Hævelse af slimhinder
- Astmatisk vejrtrækning
- Hjertebanken
- Overfølsomheds chok

Alvorlige reaktioner efter penicillin indtaget som mikstur eller tabletter er yderst sjældne hos børn.



Spørgsmål

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, eller bliver forhindret i at møde op, må I endelig kontakte os på tlf: 98881200 fra mandag til torsdag mellem kl. 8-12.



Med venlig hilsen

Børnelægeklinikken



Børnelægeklinikken

v/ Karen Tilma

Nørregade 12, 1. Sal

9700 Brønderslev

Tlf. 98 88 12 00

www.karentilma.dk

Revideret august 2014

Ansvarlig: Karen Tilma