

Tidlig pubertet (pubertas præcox)

hos

Drenge

Børnelægeklinikken



Puberteten hos drenge

Pubertet hos drenge starter typisk mellem 10-14 års alderen. De første synlige tegn er uren hud, vækst af penis/testikelvolumen og kønsbehåring. Fra 13-16 års alderen får drenge typisk hår under armene, svedtendens, skægvækst og dybere stemme.

Drengene vokser mest ca. midtvejs i puberteten i modsætning til pigerne, som vokser mest i begyndelsen.



Hvad er for tidlig pubertet

Der er tale om for tidlig pubertet, når puberteten hos drenge indtræder før det fyldte 9. år. Ofte ses det ved kønsbehåring og vækst af penis/ testisvolumen over 4ml.

Der kan være tale om naturlig pubertet, som er begyndt for tidligt, og der kan i sjældne tilfælde være tale om begyndende pubertet, som skyldes sygdom.

Undersøgelser

I Børnelægeklinikken vil du blive undersøgt med højde- og vægtnmåling, pubertetsudvikling og almindelig undersøgelse. Herefter aftaler vi et undersøgelsesprogram, som typisk vil bestå af blodprøver, røntgen af venstre hånd for at beregne såkaldt knoglealder, undersøgelse af testisvolumen/størrelse på testikler, endvidere MR-skanning af hovedet, med henblik på at vurdere hypofysens forhold (som kan have betydning ved udvikling af tidlig pubertet).

Behandling

Drenge i pubertet med vækst af penis/testikler eller andre pubertetstegn før 9 års alder, tilbydes behandling hvis:

1. Der er udsigt til lav sluthøjde
2. Psykosociale problemer pga. tidlig pubertet.



Medicinsk behandling

Medicinsk behandling udsætter puberteten og består af indsprøjtning under huden med et hormon, som skal gives hver 28. dag, de første tre indsprøjtninger gives dog med 14 dages interval.

Indsprøjtningerne kan gives hos egen læge, men kan også gives i Børnelægeklinikken.

Under alle omstændigheder foretager vi en såkaldt klinisk undersøgelse hver 3. måned, hvor vi vurderer effekten af behandlingen, og en gang om året skal der kontrolleres blodprøver og knoglealder.

Bivirkninger ved behandling

Der kan opstå kvalme, som i de fleste tilfælde er forbigående. Alternativt kan man give en forebyggende kvalmestillende behandling.

I sjældne tilfælde kan barnet begynde at reagere allergisk på indsprøjtningerne, i så fald må man skifte til et andet præparat, som fungerer stort set ligesådan.

Behandlingen vil som regel ophøre omkring 12 års alderen.

Økonomi

Behandlingen er dyr. Ifølge serviceloven kan der gives tilskud til udgifter hvis de overstiger 325 kr/måned. Henvend Jer til socialrådgiver.

Kronikertilskud søger vi automatisk fra lægemiddelstyrelsen.

Spørgsmål

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, eller bliver forhindret i at møde op, bedes I kontakte os på tlf. 98 88 12 00 fra mandag til torsdag mellem kl. 8-12.

Med venlig hilsen

Børnelægeklinikken



Børnelægeklinikken

v/ Karen Tilma

Nørregade 12, 1. Sal

9700 Brønderslev

Tlf. 98 88 12 00

www.karentilma.dk

Sidst revideret juni 2014

Ansvarlig: KT