

Kontakt læge/vagtlæge ved behov

Vær opmærksom på om du oplever nogle af følgende symptomer:

- Hævelse, kløe i ansigt, mund, hals
- Utilpashed/mavesmerter
- Udslet/rødme eller nældefeber
- Nyseture og snue/løbenæse
- Hoste og åndenød, eller pludselig fald i peakflow (Ring 112).

Spørgsmål

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, eller bliver forhindret i at møde op, må I endelig kontakte os på telefon 98881200 fra mandag til torsdag mellem kl. 8-11.

Børnelægeklinikken

v/ Karen Tilma

Nørregade 12, 1. Sal

9700 Brønderslev

Tlf. 98 88 12 00

www.karentilma.dk

Sidst revideret februar 2020

Ansvarlig: KT.

Patient Information

Allergivaccination

Børnelægeklinikken



Formål

Allergivaccination (Hyposensibilisering) kan hjælpe kroppen til at tåle fx pelsdyr, husstøvmider, pollen uden at reagere med allergiske symptomer.

Hvem

Allergivaccination er et behandlingstilbud til børn og unge med høfeber og astma, som er allergiske overfor eks. pollen, pelsdyr eller husstøvmider - og som har behov for daglig medicinsk behandling.

Der er ikke garanti for 100 % helbredelse, men langt de fleste bliver næsten fri for høfebersymptomer og kan klare sig med ganske lidt medicin.



Hvordan

Ved vaccinationen indsprøjtes en fortyndet opløsning i huden af det stof, man reagerer allergisk på. Som regel i overarmen. Der kan behandles for 2 allergier ad gangen.

Indsprøjtningen gives én gang om ugen, i stigende dosis i ca. 15 uger. Der må ikke gå mere end 2 uger mellem vaccinationerne. Herefter gives injektioner efter 2 uger, 4 uger og til sidst fast med 8 ugers interval i 3 år.

På vaccinationsdagen:

- Du møder i børnelægeklinikken. Vi starter og slutter hver vaccination med en lungefunktionsmåling.
- Du må ikke være syg med feber og lign. Så bedes du kontakte os.
- Du skal tage en antihistamin tabl. mindst $\frac{1}{2}$ time inden vaccinationen.
- Du skal blive i klinikken i 30 min. efter vaccinationen, for at vi kan følge om du reagerer på indsprøjtningen.
- Du må ikke dyrke sport og skal forholde dig roligt resten af dagen efter vaccinationen. Sauna og lange, varme bade frarådes også.



En priktest udføres forinden for at se hvad man er allergisk overfor (se pjecen 'Priktest').

Økonomi

Efter at have fået recept, skal I selv købe vaccinen på apoteket. Vaccinen skal opbevares i køleskab.

Der er mulighed for at få betalt merudgifter til behandlingen.

I skal kontakte socialrådgiver på kommunen.