

AFFØRINGSSKEMA



Børnelægeklinikken
v/Karen Tilma

Uge 1	Antal breve Movicol	Antal afføringer	Afføringstype	Bemærkninger
Mandag				
Tirsdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lørdag				
Søndag				

Uge 2	Antal breve Movicol	Antal afføringer	Afføringstype	Bemærkninger
Mandag				
Tirsdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lørdag				
Søndag				

Movicol:

1) "udtømning": Movicol junior fra 2-10 breve dagligt (1-2 g/kg/døgn) indtil afføring er vandtynd og lugtfri.

2)

Nedtrapning/vedligeholdelse

sdosis: Langsom nedtrapning med 1-2 breve ad gangen indtil 1-2 daglige afføringer type 4-5. Herefter kun nedtrapning når afføring igen bliver tynd (typer 6-7).

1 brev Movicol Junior opløses i 50 ml vand.

Picoprep:

Hvis ikke Movicol har tilstrækkelig effekt, kan man som alternativ lave udtømning med Picoprep

Picoprep gives som hovedregel en gang, dosis efter alder. Det vil i løbet af 30 min til 6 timer give vandtynd og lugtfri afføring.

Ved udtømning med Picoprep skal man være opmærksom på væskeindtag for at undgå dehydrering.

Anbefalede væskemængde ved udrensning med Picoprep:

Børn 1 år til under 2 år: 60-65 ml/timen

Børn 2 år til under 4 år: 125 ml/timen

Børn 4 år til under 9 år: 180-190 ml/timen

Børn 9 år og derover: 250 ml/timen

1 brev Picoprep opløses i 150 ml vand.

Uge 3	Antal breve Movicol	Antal afføringer	Afføringstype	Bemærkninger
Mandag				
Tirsdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lørdag				
Søndag				

Uge 4	Antal breve Movicol	Antal afføringer	Afføringstype	Bemærkninger
Mandag				
Tirsdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lørdag				
Søndag				

Udtømning:

Picoprep _____ brev opblandet i _____ml vand drikkes indenfor 15 min.

Der tilbydes _____ml væske i timen for at undgå dehydrering. Afføringen skal være vandtynd og lugtfri efter udrensning. Hvis ikke kan behandlingen gentages dagen efter.

Vedligeholdelse:

Opstartes efter udtømning i Movicol Jr. _____ breve dagligt (gerne fordelt til morgen og aften). Kan langsomt nedtrappes hvis afføringen igen bliver tynd (type 6-7) med ½ brev af gangen. Der skal være 3 dage imellem hver nedjustering af Movicol Jr.

Bristolskala for Afføringstyper

Type 1		Separate, hårde klumper, som ligner nødder	FORØG MOVICOL® DOSIS
Type 2		Pølseformet med klumper	FORØG MOVICOL® DOSIS
Type 3		Ligner en pølse med revner på ydersiden	FORØG MOVICOL® DOSIS
Type 4		Ligner en pølse, smidig og blød	FASTHOLD MOVICOL® DOSIS ✓
Type 5		Bløde klumper med skarpe kanter (lette at få ud)	FASTHOLD MOVICOL® DOSIS ✓
Type 6		Småstykker	REDUCER MOVICOL® DOSIS
Type 7		Vandig uden klumper Kun væske	REDUCER MOVICOL® DOSIS

Distributed with the kind permission of Dr K. W. Heaton; formerly reader in Medicine at the University of Bristol. Reproduced as a service to the medical profession by Norgine Ltd. ©2017 Norgine group of companies.