

## SPØRGSMÅL

Hvis du/I har spørgsmål til ovenstående, må du/I endelig kontakte os på tlf.: 98 88 12 00 fra mandag til torsdag mellem kl. 8-11. eller på e-mail

[klinikken@karentilma.dk](mailto:klinikken@karentilma.dk).

## PATIENTINFORMATION

# Priktest



### Børnelægeklinikken

#### Brønderslev

v/ Karen Tilma

Nørregade 12, 1. Sal

9700 Brønderslev

Tlf. 98 88 12 00


[www.karentilma.dk](http://www.karentilma.dk)

Sidst revideret Juli 2021

Ansvarlig: KT

Børnelægeklinikken

Brønderslev



## HVAD ER ALLERGI?

Allergi/overfølsomhed er en udbredt folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen lider af en eller anden form for allergi/overfølsomhed. De mest almindelige symptomer på allergi er:

- Kløende, røde øjne
- Løbenæse/nyseture
- Åndedrætsbesvær
- Evt. nældefeber
- Evt. fødevarerallergi med symptomer fra mave-tarmkanalen.

## FORMÅL MED PRIKTEST

Priktesten anvendes til at undersøge om barnet lider af allergi. Det kan f.eks. være allergi overfor diverse fødevarer; mælk, æg, hvede, kød, fisk osv., eller allergi overfor; græs-, birke- og bynkepollen, hest, hund og kat, husstøvmider, skimmel m.m. (Testen kan i 85 % af tilfældene påvise allergi).



## VIGTIG FORBEREDELSE INDEN TEST

Forholdsregler hvis barnet får behandling med:

- **Antihistamin:** stoppes behandlingen 3 dage før priktesten.
- **Montelukast:** stoppes behandlingen 3 dage før priktesten.
- **Prednisolon:** stoppes behandlingen 3 dage før priktesten.

Undgå ligeledes cremer på armen på selve testdagen.

## PROCEDURE

Priktesten foregår i Børnelægeklinikken.

Barnet bliver her testet med ca. 10 prik på armen, men dette varierer ud fra hvor mange allergener der skal testes for. Efter 10-15 minutter kan resultatet af priktesten aflæses.

### Udførelse af priktest:

- 1) Der placeres et stykke tape med numre på indersiden af barnets arm.
- 2) Der sættes dråber med test-ekstrakt på huden ud for numrene.
- 3) I hver dråbe foretages et lille prik på huden.
- 4) Overskydende væske aftørres og resultatet aflæses efter 10-15 min.

## KONKLUSION PÅ PRIKTEST

Hvis barnet reagerer med tydelig hævelse på ét eller flere af ekstrakterne er det udtryk for allergi og familien kan straks informeres om forholdsregler.

Ved tvivl om resultatet af priktesten kan en blodprøve blive nødvendig. Denne tages enten hos egen læge eller på sygehuset.

## BEHANDLING

Behandling vil afhænge af hvilke symptomer barnet har.

Det kan typisk være høfeber som kan behandles med antihistamin, øjendråber og næsespray. Det kan også være astma eller fødevarerallergi, som begge behandles efter sædvanlige retningslinjer.

Sjældent kan allergien give anledning til eksem eller nældefeber, som også behandles efter sædvanlige retningslinjer.

Derudover bliver barn og forældre rådgivet i hvordan den pågældende allergi kan forebygges.