

ØKONOMI

Behandlingen er dyr. Ifølge serviceloven kan der gives tilskud til udgifter hvis de overstiger 325 kr/måned. Henvend jer til socialrådgiver ved kommunen.

Kronikertilskud søger vi automatisk fra lægemiddelstyrelsen.

SPØRGSMÅL

Hvis du/I har spørgsmål til ovenstående, må du/I endelig kontakte os på tlf.: 98 88 12 00 fra mandag til torsdag mellem kl. 8-11. eller på e-mail

klinikken@karentilma.dk.



Børnelægeklinikken

Brønderslev

v/ Karen Tilma

Nørregade 12, 1. Sal

9700 Brønderslev

Tlf. 98 88 12 00

www.karentilma.dk

Sidst revideret Juli 2021

Ansvarlig: KT

PATIENTINFORMATION


Tidlig pubertet

(Pubertas præcox)

Drenge

Børnelægeklinikken

Brønderslev



PUBERTET HOS DRENGE

Pubertet hos drenge starter typisk mellem 10-14 års alderen. De første synlige tegn er:

- Uren hud
- Vækst af penis / testikelvolumen
- Kønsbehåring.

Fra 13-16 års alderen får drenge typisk hår under armene, svedtendens, skægvækst og dybere stemme.

Drengene vokser mest ca. midtvejs i puberteten i modsætning til pigerne, som vokser mest i begyndelsen.

HVAD ER FOR TIDLIG PUBERTET?

Der er tale om for tidlig pubertet, når puberteten hos drenge indtræder før det fyldte 9. år. Ofte ses det ved:

- Kønsbehåring
- Vækst af penis / testikelvolumen over 4ml.

Der kan være tale om naturlig pubertet som er begyndt for tidligt, og der kan i sjældne tilfælde være tale om begyndende pubertet som skyldes sygdom.

UNDERSØGELSER

I Børnelægeklinikken vil du blive undersøgt med:

- Højde- og vægtmåling
- Pubertetsudvikling
- Almindelig undersøgelse.

Herefter aftaler vi et undersøgelsesprogram, som typisk vil bestå af:

- Blodprøver
- Røntgen af venstre hånd for at beregne såkaldt knoglealder
- Undersøgelse af testikelvolumen / størrelse på testikler
- Endvidere MR-skanning af hovedet, med henblik på at vurdere hypofysens forhold (som kan have betydning ved udvikling af tidlig pubertet).

BEHANDLING

Drenge i pubertet med vækst af penis / testikler eller andre pubertetstegn før 9 års alder, tilbydes behandling hvis:

- Der er udsigt til lav sluthøjde
- Psykosociale problemer pga. tidlig pubertet.

MEDICINSK BEHANDLING

Den medicinske behandling udsætter puberteten og består af indsprøjtning i balden med et hormon (Procren), som skal gives hver 28. dag. De første tre indsprøjtninger gives dog med 14 dages interval.

Indsprøjtningerne kan gives hos egen læge, men kan også gives i børnelægeklinikken. Under alle omstændigheder foretager vi en såkaldt klinisk undersøgelse hver 4. måned, hvor vi vurderer effekten af behandlingen. En gang hvert $\frac{1}{2}$ år skal der kontrolleres blodprøver og knoglealder.

Når vi afslutter behandlingen forventes der at gå mellem et og halvandet år før puberteten går i gang naturligt igen.

Andre undersøgelser udføres kun ved tvivl om effekt af behandling.

BIVIRKNINGER VED BEHANDLING

Der kan opstå kvalme, som i de fleste tilfælde er forbigående. Alternativt kan man give en forebyggende kvalmestillende behandling. I sjældne tilfælde kan barnet begynde at reagere allergisk på indsprøjtningerne, i så fald må man skifte til et andet præparat, som fungerer stort set ligesådan. Behandlingen vil som regel ophøre omkring 12 års alderen.