

SPØRGSMÅL

Hvis du/I har spørgsmål til ovenstående, må du/I endelig kontakte os på tlf.: 98 88 12 00 fra mandag til torsdag mellem kl. 8-11. eller på e-mail

klinikken@karentilma.dk.



Børnelægeklinikken

Brønderslev

v/ Karen Tilma

Nørregade 12, 1. Sal

9700 Brønderslev

Tlf. 98 88 12 00

www.karentilma.dk

Sidst revideret Juli 2021


Ansvarlig: KT

PATIENTINFORMATION

Pustepøve

Børnelægeklinikken

Brønderslev



FORMÅL

Pustepróven anvendes til at undersøge for et evt. mavesår/mavekatar.

BAGGRUND

Ved pustepróven undersøges for bakterien *Helicobacter Pylori*. *Helicobakter pylori* er en bakterie som lever i det sure miljø i mavesækken og er årsag til mavekatar, tolvfingertarmssår (ulcus duodeni) og det egentlige mavesår (ulcus ventriculi).

FORBEREDELSE

- Du skal være fastende. Du må derfor ikke have spist eller drukket i mindst 6 timer før undersøgelsen.
- Du må ikke have indtaget syrehæmmende medicin, 2 uger før prøven.
- Behandling med antibiotika skal være afsluttet senest 1 uge før prøven.

SELVE PRØVEN

Det er vigtigt, at du bruger glas med grå propper til 1. pustepróve og glas med blå propper til 2. pustepróve.

1. Pustepróve - rør med grå propper

- Tag det ene prøverør med grå prop - tag proppen af. Pak pusterøret ud og stik det ned i glasset.
- Ånd ind - hold vejret kort, sæt pusterøret for munden og pust roligt i røret, indtil der ses dug på glasset. Det tager 3-5 sekunder.
- Fortsæt med at puste, mens du fjerner pusterøret fra glasset.
- Sæt proppen på umiddelbart efter, at du har pustet. Vær opmærksom på, at proppen sidder korrekt.
- Gentag ovenstående for det andet rør med hvid prop. Gem pusterøret til næste pustepróve.

Indtag testpulver

- Fyld beholderen med test-pulver $\frac{3}{4}$ op med vand, luk den og ryst forsigtigt, indtil pulveret er opløst. Hæld

herefter indholdet i et glas appelsin- eller æblejuice.

- Drik opløsningen hurtigt. Kig på uret og notér tidspunkt. Vent 30 minutter, inden du udfører næste pustepróve.

2. pustepróve - rør med blå propper

- Når de 30 minutter er gået, skal du udføre pustepróven igen - nu i de 2 prøverør med blå propper.

BEHANDLING

Hvis prøven er positiv, og man har mavesår eller mavekatar, kan det behandles med to slags penicillin i en uge og syrehæmmende medicin i 2 måneder.