

UNDGÅ GRAZAX HVIS:

- Dit barn for nylig har tabt en mælketand, fået trukket en tand ud eller gennemgået indgreb i mundhulen. Behandlingen skal da afbrydes i 7 dage for at give ro til heling.
- Dit barn har feber.
- Dit barn har astma og får en akut infektion i de øvre luftveje, som forværrer astmaen.
- Dit barn for nyligt har fået allergivaccination og reageret med svære bivirkninger.
- Dit barn lider af alvorlig fiskeallergi.

ØKONOMI

I modtager recept på Acarizax tabletterne, og skal købe tabletterne på apoteket. Kontakt apoteket og forhør jer omkring tilskud.

Er du medlem af Sygesikring Danmark (Gruppe 1,2 el 5), gives der yderligere tilskud til behandlingen.

Hvis familiens egenbetaling på 1 år overstiger ca. 4000 kr., kan resten betales af socialforvaltningen.

I dette tilfælde skal familien kontakte socialrådgiver i kommunen og søge om tilskud.

SPØRGSMÅL

Hvis du/I har spørgsmål til ovenstående, må du/I endelig kontakte os på tlf.: 98 88 12 00 fra mandag til torsdag mellem kl. 8-11. eller på e-mail klinikken@karentilma.dk.



Børnelægeklinikken

Brønderslev

v/ Karen Tilma

Nørregade 12, 1. Sal

9700 Brønderslev

Tlf. 98 88 12 00

www.karentilma.dk

Sidst revideret Juli 2021


Ansvarlig: KT

PATIENTINFORMATION

Allergivaccination for husstøvmider (Acarizax)

Børnelægeklinikken

Brønderslev



FORMÅL

Formålet med at allergivaccinere (Hyposensibilisering) er, at barnet skal kunne tåle at være i forbindelse med græs uden at få allergiske symptomer. Det er dog ikke alle som bliver fuldstændig symptomfri.

HVEM

Allergivaccination er et behandlingstilbud til børn og unge, som er allergiske overfor husstøvmider og er generet af symptomerne. Man skal først have prøvet behandling med lokale lægemidler såsom næsespray, øjendråber og antihistamintabletter. Men hvis man fortsat har symptomer, så kan man behandles med Acarizax. Dog er den nedre aldersgrænse for behandling med Acarizax 12 år.

SELVE BEHANDLINGEN

Behandlingen består i at indtage 1 daglig smeltetablet Acarizax under tungen i 3 år. Det kan nogle gange være nødvendigt med en mindre pause i behandlingen, hvis man oplever for voldsomme symptomer på sin allergi.

PROCEDURE

- **1. besøg - opstart med Acarizax:**
 - o Når man starter behandling op med Acarizax så skal første indtagelsen foregå i Børnelægeklinikken.
 - o Seneste 30 min. før ankomst til klinikken tages 5 mg Aeries. Dette for at minimere evt. reaktioner på behandlingen.
 - o Der måles en lungefunktion, en såkaldt PeakFlow ved ankomst.
 - o 1 tablet Acarizax ligges under tungen hvorefter denne opløses.
 - o Herefter skal i opholder jer 30 min. i venteværelset, så vi kan observerer evt. reaktioner.
 - o Herefter måles nyt PeakFlow, og hvis dette er fint er besøget forbi.
- **14 dages hjemmebehandling:**
 - o Efter første besøg i klinikken forsættes behandling i hjemmet i 14 dage.
 - o Der gives forsat Aeries 5 mg. 30 min før indtagelse af Acarizax.
 - o Herefter taget Acarizax.
- **2. besøg - Acarizax uden antihistamin:**
 - o Der tages **ikke** antihistamin inden besøget i klinikken.
 - o Hvis ingen bivirkninger der har været hjemme måles nyt PeakFlow.
 - o Der gives en Acarizax tablet under tungen uden forudgående Aeries.
 - o Herefter skal i opholder jer 30 min. i venteværelset, så vi kan observerer evt. reaktioner.

- o Herefter måles nyt PeakFlow, og hvis dette er fint, og der ingen reaktioner har været, er besøget forbi.
- o Behandlingen forsættes nu hjemme uden forudgående Aeries.

Optræder der problemer eller spørgsmål kontaktes Børnelægeklinikken.

Første opfølgning i Børnelægeklinikken planlægges til ca. 1 år efter start af behandling. Her vurderes om behandlingen har haft effekt, hvis dette er tilfældet fortsættes behandlingen i alt 3 år.

PRAKTISK PROCEDURE

- Tabletten lægges under tungen.
- Undgå at synke i 1 min.
- Undgå at spise og drikke i 5 min. efter indtagelse af tabletten.
- Undgå at børste tænder **inden** tabletten indtages.

EVENTUELLE BIVIRKNINGER

Der kan forekomme kløe i mund og gane, evt. kløe i øjne, evt. hævelse af slimhinder i munden, der føles som en klump i halsen. I sjældne tilfælde kan nældefeber forekomme. Bivirkninger behandles med tablet Aeries 5 mg, og forsvinder oftest efter 1-2 uger.