

KONTAKT EGEN LÆGE/VAGTLÆGE

Vær opmærksom på om du oplever nogle af følgende symptomer efter du er kommet hjem:

- Hævelse, kløe i ansigt, mund, hals
- Utilpashed/mavesmerter
- Udslæt/rødme eller nældefeber
- Nyseture og snue/løbenæse
- Hoste og åndenød, eller pludselig fald i peakflow (Ring 112).

Hvis der kommer reaktion (hævelse) ved indstikssted så måles denne i cm. på begge led og dette videregives til sygeplejersken ved næste tid i klinikken.

SPØRGSMÅL

Hvis du/I har spørgsmål til ovenstående, må du/I endelig kontakte os på tlf.: 98 88 12 00 fra mandag til torsdag mellem kl. 8-11. eller på e-mail klinikken@karentilma.dk.



Børnelægeklinikken

Brønderslev

v/ Karen Tilma

Nørregade 12, 1. Sal

9700 Brønderslev

Tlf. 98 88 12 00

www.karentilma.dk

Sidst revideret Juli 2021


Ansvarlig: KT

PATIENTINFORMATION

Allergivaccination med injektion

Børnelægeklinikken

Brønderslev



FORMÅL

Allergivaccination (Hyposensibilisering) kan hjælpe kroppen til at tåle fx pelsdyr, husstøvmider, pollen, bi og hveps uden at reagere med allergiske symptomer.

HVEM

Allergivaccination er et behandlingstilbud til børn og unge med høfeber og astma, som er allergiske overfor eks. pollen, pelsdyr eller husstøvmider - og som har behov for daglig medicinsk behandling. Man kan også hyposensibiliserer for bi og hveps, dog skal behandlingen forsætte i 5 år i stedet for 3 år.

Der er ikke garanti for 100 % helbredelse, men langt de fleste bliver næsten fri for høfebersymptomer og kan klare sig med ganske lidt medicin.



HVORDAN

Ved vaccinationen indsprøjtes en fortyndet opløsning i huden af det stof, man reagerer allergisk på. Som regel i overarmen. Der kan behandles for 2 allergier ad gangen.

Indsprøjtningen gives én gang om ugen i Børnelægeklinikken i stigende dosis i de første 15 uger. De 15 uger kan risikerer at blive udvidet med yderligere uger, da man skal gentage en dosis ved større reaktioner på forrige indsprøjtning. Der må ikke gå mere end 2 uger mellem vaccinationerne. Når man opnår fuld dosis øges intervallet imellem injektionerne med først 2 uger, så 4 uger og herefter kører det fast med 8 ugers interval i 3 år (5 år ved vaccination mod bi eller hveps, hvor man også oplæres i brug af EpiPen, hvis ikke man allerede har denne hjemme).

PÅ VACCINATIONSDAGEN

- Du skal tage en tablet antihistamin mindst $\frac{1}{2}$ time inden din vaccinationstid i Børnelægeklinikken. Dette for at minimere reaktioner på injektionen.
- Du møder i børnelægeklinikken til den aftalte tid.
- Vi starter og slutter hver vaccination med en lungefunktionsmåling, en såkaldt Peakflow.
- Du må ikke være syg med feber og lignende, så bedes du kontakte os for at få en ny tid.

- Vi anvender små kølelementer til at bedøve huden, så man ikke mærker så meget ved selve injektionen.
- Efter injektionen skal du blive i klinikkens venteværelse i 30 min. for at vi kan observere evt. reaktioner på medicinen.
- Herefter pustes igen PeakFlow og du kan tage hjem igen hvis alt er fint.
- Ved større reaktioner kan det blive nødvendigt med yderligere antihistamin.
- Du må ikke dyrke sport og skal forholde dig roligt resten af dagen efter vaccinationen.
- Sauna og lange, varme bade frarådes også.

ØKONOMI

Recepten på medicinen laves fra Børnelægeklinikken, men i skal selv købe medicinen på apoteket. Denne medbringes til klinikken, hvor vi opbevarer den i vores medicinrum.

OBS! Vaccinemedicinen skal opbevares i køleskab.

Kontakt apoteket og forhør jer omkring evt. tilskud. Er du medlem af Sygesikring Danmark (Gruppe 1,2 el 5), gives der yderligere tilskud til behandlingen.

Hvis familiens egenbetaling på 1 år overstiger ca. 4000 kr., kan resten betales af socialforvaltningen. I dette tilfælde skal familien kontakte socialrådgiver i kommunen og søge om tilskud.